

ЛЕЧИТСЯ ЛИ ТУБЕРКУЛЕЗ?

Почти всегда туберкулез является излечимым, однако для выздоровления следует пройти весь назначенный врачом и продолжающийся, как минимум, от 6 до 9 месяцев курс лечения. Обычно после нескольких недель систематического лечения больной туберкулезом больше не является инфекционно опасным.

При несистематическом приеме назначенных врачом лекарств или при прерывании лечения, может развиваться тяжело поддающаяся лечению, так называемая лекарственно устойчивая форма туберкулеза. Лечение такой формы туберкулеза обычно более длительное и менее успешное, и это заболевание может в течение нескольких лет привести к смерти.



Обычно лечение больного туберкулезом начинают в больнице, однако большая часть курса лечения проводится амбулаторно, под контролем работника здравоохранения.

ЗАЩИЩАЕТ ЛИ ВАКЦИНИРОВАНИЕ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ?

НЕТ!

В Эстонии все здоровые новорожденные вакцинируются против туберкулеза (вакциной БЦЖ), и это не защищает их от заражения туберкулезом. Вакцинирование защищает ребенка от развития тяжелых форм заболевания туберкулезом в случае заражения.



Все исследования в отношении туберкулеза и противотуберкулезные лекарства для больных являются **БЕСПЛАТНЫМИ**, вне зависимости от наличия больничного страхования



ТУБЕРКУЛЕЗ



Институт Развития Здоровья

ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ?

Туберкулез это инфекционное заболевание, которое известно также под названием чахотки, и вызывает его туберкулезная бактерия *Mycobacterium tuberculosis*. Туберкулез может поражать все органы человека, но наиболее часто поражаются легкие. При заболевании легочным туберкулезом размножение и жизнедеятельность бактерий повреждает легочную ткань, и вследствие этого возникают симптомы заболевания.



КАКОВЫ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА?

Симптомы туберкулеза, или признаки заболевания зависят от того, какой орган вовлечен в заболевание. Наиболее частым симптомом туберкулеза легких является кашель, продолжающийся более трех недель. Кашель может сопровождаться отделением мокроты, или наблюдается кровохарканье.



Другие наиболее частые признаки заболевания:

- повышенная температура,
- ночная потливость,
- потеря аппетита, уменьшение массы тела,
- утомляемость.

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТУБЕРКУЛЕЗ?



Возбудители туберкулеза распространяются по воздуху. При кашле или зевании больного туберкулезом легких вместе с брызгами слюны в воздух выбрасывается большое число возбудителей туберкулеза, которые могут вдыхаться вместе с воздухом людьми, находящимися в том же помещении.

Туберкулезом невозможно заразиться при рукопожатии с больным, при использовании одной и той же посуды для пищи или того же туалета. Больные, страдающие внелегочной формой туберкулеза, редко являются заразными.